

Palme PAG 01/02
PAG 02/03
001673



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E FARMACO
VETERINARIO - UFFICIO VI Benessere Animale
TEL 06 59946823 - 6706 FAX 06 59946845

Roma, 27/04/07

N DGSA/VI 3315 - P - I.8.d.m/3
Risposta al Foglio del 12/12/2006
N

ALL' AVITALIA
Via Salaria, 52
Roseto degli Abruzzi (TE)
Fax 085/8943046

e, p.c.

ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

UFFICI VETERINARI PER GLI
ADEMPIMENTI COMUNITARI (UVAC)
LORO SEDI

POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (PIF)
LORO SEDI

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA
DELLA SALUTE
Fax 06 8079252

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE SUL
BENESSERE ANIMALE
Fax 030 2290382

Regione Lombardia - Giunta
Sanita
03/05/2007 10.23
Arrivo 02/05/2007 10.34
MI.2007.0019116

OGGETTO: Regolamento (CE) 1/2005 - *parere sulla trasportabilità dei conigli neonati di 2 giorni di età*

In riferimento alla nota di codesta associazione del 12 dicembre 2006 sull'argomento evidenziato in oggetto, si rappresenta quanto segue:

Il Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, prevede all'allegato I, capo I, par 2d, l'ineidoneità al trasporto dei mammiferi neonati il cui ombelico non è completamente cicatrizzato.

Il trasporto del coniglio di 2 giorni di età, viene effettuato principalmente per "accasare" i futuri riproduttori spostandoli dal centro genetico di produzione ai vari allevamenti in quanto, secondo gli allevatori, questa prassi ormai consolidata in Italia ed in altri Paesi europei, trova le sue principali motivazioni nelle seguenti favorevoli condizioni:

a) Il coniglio nei primi 10 giorni di vita viene allimentato una volta al giorno per la durata di 3-5 minuti perfettamente sufficienti alla fattrice per allattare completamente; questo permette di avere un arco di tempo di 24 ore nel quale il piccolo non necessita di nessun tipo

di alimentazione e contemporaneamente, con appositi mezzi climatizzati, è possibile raggiungere quasi tutte le Regioni italiane;

b) Le nidiate vengono pareggiate alla nascita, quindi con passaggio di piccoli ad altre nidiate che con opportuni accorgimenti la coniglia ricevente accetta bene; non ci sono pertanto traumi particolari nello spostamento di piccoli anche da un allevamento ad un altro. In questo passaggio tra allevamenti i conigli possono avere problemi di ambientamento dovuti alla nuova carica batterica aspetto questo, però, che si manifesta in misura maggiore tanto più i conigli sono adulti.

c) Il piccolo di un giorno manifesta una capacità di ambientamento elevatissima, grazie anche al fatto che riesce a prendere 1-2 giorni di colostro (e quindi immunità verso le prevalenze batteriche del nuovo allevamento) dalla fattrice ricevente.

Il Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, dell'Università degli Studi di Milano in data 22 giugno 2006 ha condotto uno studio anatomo-istologico sulla zona ombelicale, allegato alla summenzionata nota del 12.12.2006, volto ad identificare il livello di chiusura della ferita ombelicale in coniglietti di 24 e 48 ore di vita, che ha evidenziato la necrosi del cordone ombelicale con chiusura vasale all'esame istologico condotto a 48 ore di vita.

Pertanto, alla luce di quanto summenzionato la scrivente Direzione Generale ritiene possibile il trasporto dei conigli neonati di 2 giorni di età purchè lo stesso avvenga nel rispetto delle condizioni generali di trasporto previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 e delle condizioni previste al punto 2.1 dell'Allegato I, capo V dello stesso, nonché con l'ausilio di appositi mezzi climatizzati..

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Ferrero